

Migreenipäänsärky = kivulle herkistyminen Liikearkuus = migreenihuimaus

Hajuarkuus

Valoarkuus

Kivulle
herkistyminen

Ääniarkuus

Liikearkuus




Liike

Valo

Ääni

Haju



Migreenikohtauksen aikana potilas on herkistynyt kaikille tuntoaistimuksille - myös liikkeelle - tämä johtaa usein huimaustunteeseen

1.1	Migreenipäänsärlyn eli aurattoman migreenin - ICHD-3 kriteerit
A	Ainakin viisi kohtausta, jotka täyttävät kriteerit B-D
B	Päänsärkykohtaus kestää 4-72 tuntia (ilman hoitoa tai jos hoito ei tehoa)
C	Ainakin kaksi seuraavista neljästä päänsärlyn piirteistä täyttyy, särky on:
1	Toispuoleista
2	Sykkivää
3	Kohtalaista tai kovaa
4	Tavanomainen ruumiillinen rasitus (esim. kävely tai portaiden nousu) pahentaa päänsärkyä tai päänsärky johtaa sen välttämiseen
D	Päänsärlyn aikana on ainakin toista seuraavista:
1	Pahoinvointia ja/tai oksentelua
2	Valo- ja ääniarkuutta
E	Muu ICHD-3 diagnoosi ei selitä oireistoa paremmin (https://www.ichd-3.org)

ICHD = The International Classification of Headache Disorders; IHS = International Headache Society

Viite: Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013;33(9):629-808.