

## Huimauksen päätyypit



Kiertohuimaus - Vertigo



Tasapainohäiriö



Kollapsi - Synkopee



Huimaus, jota on vaikea kuvata

Huimauksen aiheuttaja	Provosoiva tekijä	Ilmaantumisnopeus ja kesto	Liitännäisoireet	Tärkeät puuttuvat piirteet
<b>Tasapainohermon äkillinen vajaatoiminta (vestibulaarineuroniitti)</b>	Spontaani alku  Pään liike pahentaa, huimaus jatkuu koko episodin ajan	Äkillinen kiertohuimaus (alku minuuteissa), kesto päivistä muutamaan viikkoon	Ei	Neurologiset puutosoireet  Kuulonalenema  Tajunnanhäiriö
<b>Hyvänlaatuinen asentohuimaus</b>	Makuulle meno, ylösnousu, kumartuminen, kyljen kääntäminen aamulla ennen ylösnousua (Mutta pidempään paikallaan ollessa ei huimaa ellei pää liiku)	Äkillinen sekunneissa alkava lyhyt alle minuutin kiertohuimaus	Ei	Neurologiset puutosoireet ja paikallislöydökset  Kuulonalenema  Tajunnanhäiriö
<b>Ortostaattinen hypotensio</b>	Seisomaan nousu makuulta tai istuvasta asennosta  (Mutta: ei makuulle meno, makuuasennossa kyljen kääntäminen)	Prekollapsituntemukset ylösnoustaessa, huippaa ja silmissä hämärtyy, kesto minuutista minuutteihin	Verenpaineen lasku (ortostatismi)	Neurologiset paikallislöydökset  Kuulonalenema
<b>TIA (Transient Ischemic Attack)</b>	Spontaani alku	Äkillinen kiertohuimaus, kesto 10 - 15 minuuttia	Neurologiset aivorunko-, pikkuaivo-, tai pitkien ratojen oireet	Samanaikainen kuulonalenema ja kiertohuimaus
<b>Menieren tauti</b>	Spontaani alku  Pään liike pahentaa, huimaus jatkuu koko episodin ajan	Äkillisesti - minuuteissa-tunneissa - kehittyvä kiertohuimaus, kesto muutamia päiviä (10 min - 2 vuorokautta)	Korvatuntemukset - paine korvassa, kuulon alenema, korvan soiminen	Neurologiset paikallisoireet ja löydökset  Tajunnanhäiriö
<b>Migreenihuimaus</b>	Liike (fyysinen rasitus), ylösnousu, valo, ääni, hajut pahentavat sekä päänsärkyä että huimausta	Äkisti tai hiipien alkava kiertohuimaus, tasapainohäiriön tuntu tai presynkopee-tuntemukset, kesto minuutista tunteihin ja päiviin	Migreenin päänsärky tai aura, yleinen aistiherkkyys (valolle, äänille, hajuille, liikkeelle)	Neurologiset paikallislöydökset  Kuulonalenema

Ortostatismi: verenpaineen lasku: RR maaten - RR seisten = RR systole >20 mmHg tai RR diastole >10 mmHg

Aivorunko-oireet ja löydökset: näkö-, kasvo- ja puheoireet (kaksoiskuvat, suuntaa vaihtava nystagmus, kasvojen tuntohäiriö, kasvohermoalvaus, puheen puuromaisuus, pikkuaivo-oireet: epävarma leveäraiteinen kävely, liikkeiden hapuilu (ataksia) ja epätarkkuus, huono tasapaino, pitkien ratojen oireet: hemipareesi, tetrapareesi, toispuoleinen tuntohäiriö (hemisensorinen oire)

Toimintahäiriön sijainti	Liitännäisoire, joka auttaa vaurion paikantamisessa
<b>Sisäkorva</b>	Kuulonalenema, korvan soiminen, paineen tunne korvassa, korvakipu
<b>Kuulo-tasapainohermo (VIII aivohermo )</b>	Huono puheen (äänteiden) erottelukyky, kuulonalenema, tasapainohäiriö
<b>Aivorunko</b>	Kaksoiskuvat, kasvojen tuntohäiriö, kasvohermohalvaus, puuomainen puhe (dysartria), "pitkien ratojen oireet"
<b>Pikkuaivot</b>	Liikkeiden hapuilu, epätarkkuus (ataksia), leveäraiteinen epävarma kävely, liikerytmin katoaminen (dysdiadokokineesi)
<b>Tyvitumakkeet</b>	Liikkeiden hitaus, jäykkyys, vapina, muut liikehäiriöt, laahustava etukumara kävelyasento
<b>Aivokuori (hemisfäärit)</b>	Puhevaikeus (dysfasia), katveoire (huomiotta jättäminen, inattentio, neglect), toispuolihalvaus (hemipareesi), näkökenttäpuutos (hemianopia)
<b>Niska (lihakset, ligamentit, välilevyt, hermojuuret)</b>	Niska-, selkä-, hartia-, yläraajajännitys, hermojuuriperäinen "radikulaarinen" kipu
<b>Selkäydin</b>	Kävelyepävarmuus pimeässä, alaraajaheikkous ja -jäykkyys, muutokset virtsarakon toiminnassa, alaraajahalvaus (parapareesi)
<b>Perifeerinen hermosto</b>	Jalkojen puutuminen tai pistely ("distaalinen" - varpasiin ja jalkateriin painottuva)
<b>Sydän</b>	Kollapsikohtaukset, rintakipu, hengenahdistus, rytmihäiriötuntemukset, alaraajaturvotus, huono rasituksen sieto
<b>Psyyke</b>	Paniikki- ja hyperventilaatioitaipumus, ahdistus, masennus, pelkotilat